

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku  
Elektrotehnički fakultet  
Kneza Trpimira bb  
31 000 Osijek

Osijek, 19. studenog 2007.

Seminarski rad iz predmeta "Matematičko programiranje"

**Newtonova metoda  
za rješavanje nelinearne jednadžbe  $f(x) = 0$**

IME PREZIME I<sup>1</sup>, IME PREZIME II<sup>2</sup>

**Sažetak.** U ovom seminarskom radu analizira se Newtonova metoda za rješavanje jednadžbe  $f(x) = 0$ , gdje je  $f \in C^2[a, b]$  funkcija zadan na intervalu  $[a, b]$ . Dane su osnovne karakteristike i svojstva ove metode. Izrađen je odgovarajući *Mathematica*-modul pomoću kojega je analizirana metoda na nekoliko ilustrativnih primjera.

**Ključne riječi:** Newtonova metoda, nultočke funkcije

**Abstract.** (Newton's method for solving a nonlinear equation  $f(x) = 0$ ) In this seminar paper Newton's method for solving equation  $f(x) = 0$  is analysed, where  $f \in C^2[a, b]$  is a function defined on the interval  $[a, b]$ . Basic characteristics and properties of this method are given. A corresponding *Mathematica* module is made by means of which the method is analysed on several illustrative examples.

**Keywords:** Newton's method, roots of a function

**AMS Mathematical Classifications (2000):** 65H05

Preuzimanje seminara	Izlaganje	Ocjena	Datum	Potpis

---

<sup>1</sup>e-mail: [ImePrezimeI@etfos.hr](mailto:ImePrezimeI@etfos.hr)

<sup>2</sup>e-mail: [ImePrezimeII@etfos.hr](mailto:ImePrezimeII@etfos.hr)

## 1 Uvod

Promatramo realnu neprekidnu funkciju  $f$  definiranu na zatvorenom intervalu  $[a, b]$ . Općenito, svaki kompleksni broj  $\xi$ , koji je rješenje jednadžbe

$$f(x) = 0, \quad (1)$$

nazivamo nultočkom funkcije  $f$ . Mi ćemo se ograničiti na istraživanje samo realnih nultočaka funkcije  $f$  (sjecišta grafa funkcije s osi  $x$ ). Općenito se može dogoditi da neka funkcija ima više realnih nultočaka, da su neke višestruke ili da uopće nema realnih nultočaka.

Ako je funkcija  $f$  neprekidna na intervalu  $I = [a, b]$  i ako na rubovima intervala prima suprotne vrijednosti (tj. ako je  $f(a) \cdot f(b) < 0$ ), onda (vidi JUKIĆ (2000), str. 120), postoji barem jedna točka  $\xi \in I$ , za koju vrijedi  $f(\xi) = 0$ . Ako je, osim toga, prva derivacija  $f'$  stalnog predznaka na intervalu  $I$ , onda je to i jedina nultočka funkcije  $f$  na intervalu  $I$ . Na taj se način posao oko traženja realnog rješenja jednadžbe (1) svodi na dva koraka:

1. Separirati interval  $I$ , u kome funkcija ima nultočku,
2. Nekom iterativnom metodom odrediti aproksimaciju nultočke  $\xi$  s unaprijed zadanim točnošću.

Spomenuti interval  $I = [a, b]$ , u kome se nalazi barem jedna nultočka funkcije  $f$ , treba odrediti tako da na njegovim rubovima funkcija prima vrijednosti suprotnog predznaka, tj. da bude

$$f(a) \cdot f(b) < 0.$$

## 2 Newtonova metoda

Prepostavimo da smo na neki način odredili interval  $I = [a, b]$ , u kome se nalazi jedinstvena nultočka neprekidne i dovoljno "glatke" funkcije  $f$  za koju je  $f'(x) \neq 0 \forall x \in I$ . Izaberimo početnu aproksimaciju  $x_0 \in I$ , razvijmo funkciju  $f$  u Taylorov red u okolini točke  $x_0$  i zadržimo se na linearном članu. Tako smo funkciju  $f$  u okolini točke  $x_0$  aproksimirali linearom funkcijom

$$f_1(x) = f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0)$$

čiji graf je tangenta na graf funkcije  $f$  u točki  $x_0$ .

Sada ćemo umjesto rješavanja jednadžbe (1), rješavati jednadžbu  $f_1(x) = 0$  (geometrijski gledano, umjesto traženja sjecišta grafa funkcije  $f$  s osi  $x$ , tražimo sjecište tangente s osi  $x$ ). Rješenje jednadžbe  $f_1(x) = 0$  označimo s  $x_1$

$$x_1 := x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

Ponavlajući postupak, dobivamo niz  $x_0, x_1, \dots$  zadan rekurzivnom formulom<sup>3</sup>

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n = 0, 1, \dots \quad (2)$$

---

<sup>3</sup>U literaturi često ovu metodu možemo naći pod imenom *Newton-Raphsonova metoda*.

Važno je primijetiti da u svakoj iteraciji konstruiramo lokalni aproksimant funkcije  $f$  i onda tražimo nultočku lokalnog aproksimanta.

Ako je  $x_n$  jedna aproksimacija nultočke  $\xi$  u intervalu  $I = [a, b]$  i ako je  $f$  derivabilna funkcija, takva da je  $|f'(x)| > 0$ ,  $x \in I$ , onda iz Lagrangeovog teorema o srednjoj vrijednosti (vidi primjerice [1]) slijedi ovakva ocjena absolutne pogreške  $n$ -te aproksimacije

$$|\xi - x_n| \leq \frac{|f(x_n)|}{m_1}, \quad \text{gdje je } 0 < m_1 = \min_{x \in I} |f'(x)|. \quad (3)$$

O konvergenciji Newtonove metode može se vidjeti u [2], [3], [6]. Vrijedi slijedeći teorem (dokaz vidi primjerice u [6]):

**Teorem 1** Neka funkcija  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  ima neprekidnu drugu derivaciju na intervalu  $I = [a, b]$ . Neka je nadalje,  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , a prva ( $f'$ ) i druga ( $f''$ ) derivacija funkcije  $f$  na intervalu  $I$  imaju stalan predznak.

Tada, ako je  $x_0 \in I$  izabran tako da bude

$$f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0, \quad (4)$$

niz definiran s (2) konvergira prema jedinstvenom rješenju  $\xi$  jednadžbe  $f(x) = 0$ .

Pri tome vrijedi ocjena pogreške aproksimacije

$$|\xi - x_n| \leq \frac{M_2}{2m_1} (x_n - x_{n-1})^2, \quad (5)$$

gdje je

$$m_1 = \min_{x \in I} |f'(x)|, \quad M_2 = \max_{x \in I} |f''(x)|,$$

a metoda ima kvadratnu brzinu konvergencije, tj. vrijedi

$$|\xi - x_{n+1}| \leq \frac{M_2}{2m_1} (\xi - x_n)^2. \quad (6)$$

### 3 Numerički eksperimenti


Na nekoliko numeričkih i praktičnih primjera, a na bazi vlastitog programa izrađenog u programskom sustavu *Mathematica* ilustrirat ćemo prednosti i nedostatke Newtonove metode.

**Primjer 1** S točnošću  $\epsilon = 0.00005$  (4 signifikantne decimale) treba odrediti pozitivnu nultočku funkcije

$$f(x) = e^{-x} + x^2 - 2.$$

Ova funkcija ima dvije nultočke. Jednu možemo lokalizirati u intervalu  $I_1 = [-1, 0]$  a drugu u intervalu  $I_2 = [1, 2]$  (Slika 1). Mi ćemo potražiti nultočku iz intervala  $[1, 2]$ . Kako je  $f'(x) = -e^{-x} + 2x$ , funkcija  $f$  je rastuća na intervalu  $I_2$  i imamo  $m_1 = f'(1) \geq 1.6$ , a kako je  $f(2) \cdot f''(2) > 0$  za početnu aproksimaciju izabrat ćemo  $x_0 = 2$ .

Nakon 3 iteracije dobivamo  $x^* = 1.3160$ . Tijek iterativnog procesa prikazan je u Tablici 1 (g0 je desna strana ocjene (3)). Primijetite da sama vrijednost funkcije još uvijek nije manja od  $\epsilon$ .



Slika 1: Lokalizacija nultočaka

$n$	$x_n$	$g_0$	$f(x_n)$
0	2	1.334585	2.135336
1	1.4475	0.206462	0.330339
2	1.3233	0.010823	0.017316
3	1.3160	0.000037	0.000060

Tablica 1 Tijek iterativnog procesa

Niže je naveden modul `NewtonMethod` kojim se uz primjenu Newtonove metode traži nultočka funkcije.

```
In[1]:= NewtonMethod[f_, x0_, m1_, eps_, Imax_, ind_] := Module[{x = x0, n = 0},
(* f - funkcija *)
(* x0 - pocetna aproksimacija *)
(* m1 - broj iz ocjene (3) *)
(* eps - tocnost *)
(* Imax - maksimalno dozvoljen broj iteracija *)
(* ako je ind = 0, nece se ispisivati iterativni proces; u protivnom, hoce *)
While[N[Abs[f[x]]/m1] > eps && n < Imax,
If[ind != 0,
Print["x_", n, " = ", x, ", pogreska = ", f[x]/m1, ", f(x_", n, ")=", f[x]/N];
x = N[x - f[x]/f'[x]]; n = n + 1];
{n, x}]
```

koji uz poziv

```
In[1]:= f[x_] := Exp[-x] + x^2 - 2;
NewtonMethod[f, 2, 1.6, .00005, 10, 0]
```

daje broj potrebnih iteracija i vrijednost dobivene aproksimacije nultočke

```
Out[3]:= {3, 1.316}
```

## Literatura

- [1] D. JUKIĆ, R. SCITOVSKI, *Matematika I*, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Osijek, 2000.
- [2] D. KINCAID, W. CHENEY, *Numerical Analysis*, Brooks/Cole Publishing Company, New York, 1996.
- [3] R. PLATO, *Concise Numerical Mathematics*, American Mathematical Society, Providence, 2003.
- [4] R. PLATO, *Numerische Mathematik kompakte*, Vieweg Verlag, München, 1962.  
<http://www.ams.org/bookpages/gsm-57>

- [5] W. H. PRESS, B. P. FLANNERY, S. A. TEUKOLSKY, W. T. VETTERLING, *Numerical Recipes*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
- [6] R. SCITOVSKI, *Numerička matematika*, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Osijek, 2000
- [7] J. STOER, *Numerische Mathematik 1*, 8. Auflage, Springer–Verlag, Berlin, 2002.
- [8] J. STOER, R. BULIRSCH, *Introduction to Numerical Analysis*, 2nd Ed., Springer Verlag, New York, 1993.